

	APPL.	BBCH	ZEITPUNKT	DOSIERUNG	
Mais	1	13-15	3-6 Blatt Stadium	50	g/ha
	2*	16-18	6-8 Blatt Stadium	50	g/ha
Getreide	1	13-15	3-6 Blatt Stadium	100	g/ha
	2*	30	Beginn des Schossens	100	g/ha
Raps	1	13-15	3-5 Blatt Stadium	100	g/ha
	2*	50	Hauptinfloreszenz bereits vorhanden, von den obersten Blättern noch dicht umschlossen	100	g/ha
Sonnenblume	1	13-15	3-5 Laubblätter entfaltet	100	g/ha
	2*	51	Infloreszenz-Knospe zwischen den jungen Blättern gerade erkennbar (Stern-Stadium)	100	g/ha
Leguminosen	1	13-15	3-5 Laubblätter entfaltet	100	g/ha
	2*		Blütenknospen vorhanden, jedoch von Blättern umhüllt	100	g/ha
Zuckerrübe	1	13-15	3-5 Blatt Stadium	100	g/ha
	2	33	Beginn Bestandsschluss: 10% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich	100	g/ha
Kartoffel	1	13-15	3-5 Laubblätter entfaltet	100	g/ha
	2	51	Knospen d. 1. Blütenanlage (Hauptspross) sichtbar (1-2mm)	100	g/ha
	3		3-4 Wochen später	100	g/ha



ComCat®

Das Pflanzenstärkungsmittel zur allgemeinen Gesunderhaltung der Pflanzen.



AgraForUm

natural solutions for the future

